VASO PURE®

Crema

Crema ad azione chelante e proteolitica
Adiuvante nel linfodrenaggio

INTRODUZIONE

L'edema è un accumulo di liquido di varia consistenza (molle, elastica o dura) negli spazi intercellulari e negli interstizi dei tessuti, che si manifesta con gonfiore e sensazione di tensione o pienezza. Esistono diversi tipi di edema: da trauma, da stasi degli arti inferiori, da stasi linfatica, da sovraccarico, da stasi venosa, ecc.. Il gonfiore è il comun denominatore di tutti gli edemi.

Ridurre il gonfiore rappresenta l'obiettivo principale da raggiungere.

In generale è utile sottoporsi a massaggi che favoriscano il drenaggio dei liquidi. Per questo tipo di massaggio, la pressione sul paziente deve essere leggera per ottenere un effetto piacevole e rilassante.

Il Linfodrenaggio manuale stimola, favorisce e accelera la circolazione del sistema linfatico e si esegue su:

- Arti edematosi
- Cellulite
- Smagliature
- Persone che hanno subito una liposuzione
- Linfedema
- Etc.

Numerose evidenze clinico-sperimentali hanno messo in evidenza la presenza di depositi di ferro nel tessuto adiposo e nel fluido interstiziale.

I liquidi, trasudati dal flusso venoso, portano con sé delle molecole contenenti ioni ferro. L'accumulo di ferro, comunque determinato, è sempre tossico o mortale per la vita cellulare e se presente in prossimità di lipidi gli ioni ferro attivano un processo di perossidazione che porta ad una graduale infiammazione di tutto il tessuto. La tossicità del ferro è dovuta quindi alla sua forte azione ossidante: il ferro, infatti, allo stato libero reagisce facilmente con ossigeno e perossidi producendo pericolosi radicali liberi, sostanze di cui è ben nota l'attività dannosa sulle strutture cellulari.

La stasi di sostanze tossiche tra cui il ferro, l'aumento dei radicali liberi, l'acidità tissutale, la riduzione dell'ossigenazione, ecc., influiscono nel tempo sullo stato della matrice interstiziale e quindi sulla struttura dei tessuti portando alla formazione delle tipiche irregolarità cutanee come **la pelle a buccia d'arancia**.

Un'altra importante caratteristica dell'edema linfatico è la presenza di proteine idrofile, come l'albumina, che tendono a far aumentare la ritenzione idrica interstiziale e quindi il gonfiore.
Questa caratteristica fa sì che le proteine ristagnanti nella matrice interstiziale, da un lato attraggano a sé le molecole di acqua, analogamente alle calamite con le particelle di ferro, dall'altro stimolino i fibroblasti presenti a livello locale a produrre fibre di collagene e conseguentemente tessuto fibro-sclerotico.

COMPONENTI DELLA CREMA

Vasopure è a base di Apo-lattoferrina in liposomi e MSM (Metilsufonilmetano).

- La Apo-lattoferrina, è un chelante del ferro ed è anche un inibitore della lipogenesi.

La Apo-lattoferrina in liposomi è l'unica forma attiva della lattoferrina.
L'utilizzo dei liposomi, ci consente di portare sostanze attive in profondità mantenendone inalterate le loro proprietà e la loro stabilità.

- MSM, Metilsulfonilmetano, è un composto organico sulfureo che agisce in sinergia con i chelanti del ferro. Denatura le proteine idrofile come l'albumina migliorando il tessuto Lipodermatosclerotico.

Un'importante caratteristica dell'edema linfatico è infatti la presenza di proteine idrofile, come l'albumina, che tendono a far aumentare la ritenzione idrica interstiziale e quindi il gonfiore.

QUANDO E COME APPLICARE LA CREMA

Nel linfodrenaggio manuale: applicare un'aliquota di crema dopo un accurato lavaggio della parte e prima del trattamento, massaggiando con movimenti circolari seguendo il senso del flusso linfatico dal basso verso l'alto.
Come idratante e rigenerante: applicare un velo di crema una volta al giorno massaggiando fino a completo assorbimento.

Lascia la pelle liscia e ridona elasticità al fresco profumo di Geranio ed Eucalipto. Si consigliano cicli di 45/60 giorni.

EVIDENZE SCENTIFICHE

Con lo scopo di testare l'efficacia di **Vasopure** sono stati valutati gli effetti su 20 volontarie donne che hanno utilizzato il prodotto due volte al giorno per un periodo di tempo di otto settimane. Le donne, di età compresa tra 18 e 60 anni, avevano cellulite e adiposità localizzate. Durante il test sono state misurate le proprietà della pelle utilizzando strumenti speciali; inoltre le donne sono state invitate a riferire le loro impressioni.

Vasopure è in grado di aumentare l'idratazione cutanea della pelle

Attraverso la corneometria, un tipo di esame che serve a misurare il livello di idratazione cutanea, è stato possibile dimostrare che il **Vasopure** applicato due volte al giorno durante otto settimane, provoca un miglioramento dell'idratazione cutanea pari al 15%.

Vasopure® è in grado di aumentare il livello di elasticitá della pelle

Sono state effettuate misurazioni di elasticità mediante elastomero. L'elasticità cutanea riflette la capacità potenziale di retrazione della pelle, con il dispositivo applicato due volte al giorno durante otto settimane, vi è un aumento della elasticità cutanea.

Vasopure riduce la massa grassa

Sono state effettuate misurazioni della massa grassa e dell'acqua extracellulare tramite l'analisi di impedenziometria. Grazie alle proprietà della Lattoferrina, come inibitore della lipogenesi, è stato possibile dimostrare che il **Vasopure** applicato due volte al giorno durante otto settimane, provoca una riduzione della massa grassa.

RISULTATI DELL'AUTOVALUTAZIONE

Dopo otto settimane, le donne cha hanno completato lo studio hanno riferito risultati decisamente positivi.

PARAMETRI CLINICI*:

- Il microcircolo migliora nel 50% dei volontari.
- La visibilità delle adiposità localizzate si riduce nel 35% dei volontari.
- La visibilità della pelle a buccia d'arancia si riduce nel 60% dei volontari.
- Si evidenzia un effetto rassodante cutaneo nel 70% dei volontari.

*dopo otto settimane di trattamento.

CONFEZIONAMENTI

Uso esterno – flacone da 200 ml
Uso esterno – 30 bustine da 10 g

PRODOTTO DA

TDC Technology Dedicated to Care S.r.l.
Via Copernico, 38 - 20125 Milano
E-mail: info@tdcare.it

BREVETTO EUROPEO